

## Flexofytol<sup>®</sup> PLUS



N1737-18/07

Vieillesse, mouvements répétitifs, sports, surpoids, chocs... tel est le quotidien de vos articulations. Pour préserver votre mobilité ainsi que votre qualité de vie, il est nécessaire de prendre soin de vos articulations.

### UTILISATION

Grâce à la synergie de ses 3 actifs, le curcuma, le *Boswellia serrata* et la vitamine D, Flexofytol<sup>®</sup> PLUS contribue à **maintenir la flexibilité et la souplesse de vos articulations, muscles et tendons.**

### MODE D'ACTION

Flexofytol<sup>®</sup> PLUS contient un **extrait de curcuma exclusif** standardisé en curcumine et étudié scientifiquement sur plus de 2800 personnes en Belgique. La formulation de cet extrait permet de garantir un effet optimal pour vous aider à continuer de bouger en toute liberté.

La résine de ***Boswellia serrata***, dont les principes actifs sont les acides boswelliques, est reconnue pour le maintien de la bonne santé des articulations. Comme pour le curcuma, ses bienfaits ont été étudiés scientifiquement.

La **vitamine D** contribue à maintenir le fonctionnement normal des muscles.

### CONSEILS D'UTILISATION

À prendre **pendant** les repas pour optimiser l'assimilation du *Boswellia*

ENFANTS 6 À 11 ANS	ADULTES ET ENFANTS DÈS 12 ANS
<b>Prise initiale:</b> 2  le matin	<b>Prise initiale:</b> 2  matin & soir
<b>Prise d'entretien:</b> 1  le matin	<b>Prise d'entretien:</b> 2  le matin

Flexofytol<sup>®</sup> PLUS ne peut être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans.

**En cas de difficultés à avaler le comprimé, il est possible de le couper avec un coupe-comprimé ou de le piler.**

**Flexofytol<sup>®</sup> PLUS peut être utilisé pendant de longues périodes avec une très bonne tolérance gastrique.**

**La prise de Flexofytol<sup>®</sup> PLUS peut engendrer une coloration des urines. Il s'agit d'un phénomène normal dû à l'un de ses composants.**

**Précautions:** Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement, ni en cas d'obstruction des voies biliaires. • Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants.

### INGRÉDIENTS par comprimé

Agents de charge : cellulose microcristalline, phosphate dicalcique • Edulcorant : mannitol • Agents de charge : copolymère méthacrylate basique, oxyde de magnésium • **Oléorésine de boswellia (*Boswellia serrata*) 120 mg standardisé à 65% d'acides boswelliques** • Amidon • **Extrait sec exclusif et standardisé de rhizome de curcuma (*Curcuma longa*) 93 mg dont 80 mg de curcumine** • Anti-agglomérants : dioxyde de silicium, sels de magnésium d'acides gras, talc • Agents d'enrobage : hydroxypropylméthylcellulose, polydextrose, carbonate de calcium • Triglycérides à chaîne moyenne • **Cholécalciférol (vitamine D) 1,8 µg** (pour 4 comprimés = 7,2 µg, soit 144% VNR\*) - Colorants : oxyde de fer jaune, riboflavine, carmins.

\*VNR = Valeurs Nutritionnelles de référence.

