

Bijsluiter voor het publiek : **LAXAFYTOL capsules, hard**

Gelieve de hele bijsluiter aandachtig door te lezen alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat informatie die van belang is voor uw behandeling.

Alhoewel dit geneesmiddel in de apotheek vrij te verkrijgen is, moeten de instructies van de bijsluiter worden opgevolgd om een optimaal resultaat te bekomen.

Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie als u andere vragen hebt of in geval van twijfel.

- Bewaar deze bijsluiter, u moet hem misschien nogmaals lezen.
- Neem contact op met uw apotheker indien u meer info wenst.
- Indien de symptomen ernstiger worden of aanhouden na 14 dagen behandeling, dient u uw arts te raadplegen.

Inhoud van deze bijsluiter :

1. Beschrijving van LAXAFYTOL capsules en wanneer worden ze gebruikt?
2. Welke informatie is er belangrijk voor het innemen van LAXAFYTOL capsules ?
3. Hoe LAXAFYTOL capsules innemen ?
4. De eventuele nevenwerkingen.
5. Hoe LAXAFYTOL capsules bewaren?
6. Bijkomende informatie.

Rhamnus purshianus D.C. (Cascara), bast.

LAXAFYTOL 25 mg capsules, 25 mg hydroxyanthraceenderivaten, capsules voor oraal gebruik.

De werkzame stof is het droge waterige extract van de *Rhamnus purshianus* D.C. (cascara), bast, hoeveelheid die overeenstemt met 25 mg hydroxyanthraceenderivaten.

De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, watervrij colloïdaal silicium, tricalciumfosfaat, magnesiumstearaat, talk en gelatinecapsule (gelatine, titaandioxide, ijzeroxidegeel).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, België

Fabrikant :

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen : BE 273874

1. Beschrijving van LAXAFYTOL 25 mg capsules en wanneer worden ze gebruikt?

LAXAFYTOL is verkrijgbaar in de vorm van ondoorzichtige ivorkleurige capsules.

LAXAFYTOL is een laxeermiddel op basis van planten. Dit geneesmiddel is te gebruiken bij constipatie, nadat alle ernstige ziekteverschijnselen zijn verdwenen.

2. Welke informatie is er belangrijk voor het innemen van LAXAFYTOL 25 mg capsules?

LAXAFYTOL niet gebruiken bij constipatie ten gevolge van een obstructie van de spijsverteringswegen, ontsteking van de dikke darm, buikpijn van onbepaalde oorsprong, overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het preparaat.

Opgelet, niet continu gebruiken gedurende meer dan 10 dagen.

Een langdurig gebruik wordt afgeraden, teneinde een afhankelijkheid van de darm ten opzichte van dit geneesmiddel te vermijden. Oudere personen of personen met slecht werkende nieren of een slecht werkend hart, moeten omzichtig te werk gaan bij gebruik van

dit geneesmiddel. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. De tekenen van een overdosering zijn : diarree, buikpijn, neiging tot syncope. Het kan nodig zijn om een antidiarreeïcum in te nemen.

Als u reeds andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve eveneens de rubriek « gebruik van LAXAFYTOL in combinatie met andere geneesmiddelen » te lezen.

Gelieve uw arts te raadplegen indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van LAXAFYTOL in combinatie met voedsel en drank

Niet van toepassing.

Zwangerschap

Gelieve advies te vragen aan uw arts of aan uw apotheker alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Wat het gebruik van LAXAFYTOL tijdens de zwangerschap betreft, beschikken we niet over voldoende gegevens om eventuele nefaste gevolgen uit te sluiten. Het gebruik van dit geneesmiddel wordt dus afgeraden tijdens deze periode.

Borstvoeding

Gelieve advies te vragen aan uw arts of aan uw apotheker alvorens enig geneesmiddel in te nemen. Wat het gebruik van LAXAFYTOL tijdens de periode van borstvoeding betreft, beschikken we niet over voldoende gegevens om eventuele nefaste gevolgen uit te sluiten. Het gebruik van dit geneesmiddel wordt dus afgeraden tijdens deze periode.

Rijvaardigheid en het gebruiken van machines

Niet van toepassing.

Belangrijke informatie betreffende bepaalde bestanddelen van LAXAFYTOL

Niet van toepassing

Gebruik van LAXAFYTOL in combinatie met andere geneesmiddelen

Gelieve uw arts of uw apotheker in te lichten indien u andere geneesmiddelen gebruikt of indien u er onlangs hebt gebruikt, zelfs wanneer het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. Er zijn interacties met digitalisachtige geneesmiddelen voor het hart, geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen en waterafdrijvende geneesmiddelen. Er is risico op verminderde betrouwbaarheid van orale contraceptiva, bij gelijktijdige inname met dit geneesmiddel.

3. Hoe LAXAFYTOL 25 mg capsules innemen ?

Gelieve deze instructies nauwgezet te volgen, tenzij uw arts u andere instructies heeft gegeven. Raadpleeg uw arts of apotheker in geval van onzekerheid.

Indien er geen enkele verbetering merkbaar is, opnieuw uw arts raadplegen.

Volwassenen en kinderen van meer dan 12 jaar : neem 1 capsule per dag, bij voorkeur 's avonds vóór het slapengaan, of 's morgens vóór het ontbijt.

Maximum 2 capsules per dag innemen.

De capsule inslikken bij het drinken van een groot glas water.

Om de constipatie te overwinnen, is het wenselijk om veel water te drinken (2 liter per dag) en om vezelrijke voeding te eten (fruit, groenten, volledige granen).

Waarschuwing : u mag dit geneesmiddel niet langer dan 10 dagen gebruiken zonder doktersvoorschrift.

Indien u vergeten bent om LAXAFYTOL in te nemen.

Niet van toepassing.

Verschijnselen die kunnen optreden wanneer de behandeling met LAXAFYTOL wordt gestopt.

Dit geneesmiddel dient enkel gebruikt te worden in geval van stoornissen.

Indien u meer LAXAFYTOL hebt ingenomen dan u zou mogen, onmiddellijk contact opnemen met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

4. De eventuele nevenwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen, kan LAXAFYTOL ongewenste bijwerkingen hebben.

In geval van overdosering, kan LAXAFYTOL diarree of buikpijn veroorzaken. Langdurig gebruik kan aanleiding geven tot vocht- en zoutverlies (vooral kalium), spierzwakte en gewichtsverlies. De urine krijgt soms een bruinrode kleur. Langdurig gebruik van dit geneesmiddel kan aanleiding geven tot het zwart verkleuren van het darmslijmvlies en van de endeldarm. Deze bijwerkingen verdwijnen wanneer de behandeling wordt stopgezet. Indien u ongewenste effecten zou opmerken die niet in deze bijsluiter zijn vermeld en die u als ernstig beschouwt, gelieve dit aan uw arts of apotheker te melden.

5. Hoe LAXAFYTOL 25 mg capsules bewaren ?

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bewaren bij een temperatuur beneden 25°C, donker en droog. Het is raadzaam het geneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking te bewaren. LAXAFYTOL niet gebruiken na de vervaldatum die staat op de verpakking na de afkorting "EXP" : de eerste 2 cijfers wijzen op de maand en de laatste 2 op het jaar. Het product vervalt op de laatste dag van de aangeduide maand.

6. Bijkomende informatie.

Neem contact op met uw arts of apotheker voor verdere informatie over dit geneesmiddel. Indien u het wenst, kan u eveneens contact opnemen met de plaatselijke registratiehouder :
Tilman s.a., Z.I. Sud 15, B-5377 Baillonville.

Afleveringswijze: vrij van medisch voorschrift

De datum van de laatste herziening van de bijsluiter is 27/05/2009

De datum van goedkeuring van de bijsluiter is 27/05/2009