

Packungsbeilage : **SEDANXIO Hartkapseln**

Lesen Sie den Inhalt dieser Packungsbeilage vor Einnahme des Medikaments sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Behandlung.

Auch wenn dieses Arzneimittel in Apotheken frei verkäuflich ist, müssen die Hinweise in der Packungsbeilage beachtet werden, um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen.

Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt oder Apotheker.

- Bewahren Sie diese Packungsbeilage zur späteren Bezugnahme gut auf.
- Wenn Sie weitere Informationen oder Beratung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Apotheker.
- Sollten sich die Symptome verschlimmern oder nach 20 Tagen noch immer vorhanden sein, suchen Sie Ihren Arzt auf.

Inhalt dieser Packungsbeilage :

1. Was ist SEDANXIO Hartkapseln und in welchem Fall wird es verwendet ?
2. Was müssen Sie wissen, bevor Sie SEDANXIO Hartkapseln einnehmen ?
3. Wie ist SEDANXIO Hartkapseln einzunehmen ?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie ist SEDANXIO Hartkapseln aufzubewahren ?
6. Ergänzende Informationen.

Passiflora incarnata L. (Passionsblume).

SEDANXIO Hartkapseln, hydroalkoholischer Trockenextrakt aus Trieben der Passionsblume (60% V/V) (2:1) (*Passiflora incarnata L.*) 200 mg.

Die weiteren Bestandteile sind : mikrokristalline Zellulose, Trikalziumphosphat, wasserfreie kolloidale Kieselerde, Talkum, Magnesiumstearat und die Hartkapsel (Gelatine - Titandioxid - Azorubin).

Zulassungsinhaber :

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien

Hersteller :

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien

Zulassungsnummer : BE 215022

1. Was ist SEDANXIO Hartkapseln und in welchem Fall wird es verwendet ?

SEDANXIO sind Hartkapseln zur oralen Einnahme.

SEDANXIO ist ein Arzneimittel auf pflanzlicher Basis für Erwachsene und Kindern über 12 Jahre zur Anwendung bei Nervosität oder Schlafstörungen, sofern eine etwaige schwere Erkrankung ausgeschlossen werden konnte.

2. Was müssen Sie wissen, bevor Sie SEDANXIO Hartkapseln einnehmen ?

Verwenden Sie SEDANXIO nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Präparats.

Vorsicht : Wenden Sie das Arzneimittel nicht bei Kindern unter 12 Jahren an.

In vielen Fällen ist die Verabreichung dieses Präparats nur gelegentlich oder vorübergehend erforderlich und ist daher nur von kurzer Dauer. In einigen Fällen kann auch eine längere Behandlung geboten sein. Bei längerer Verwendung muss die Behandlung regelmäßig von Ihrem Arzt beurteilt werden. Sollten die Symptome andauern oder sich verschlimmern, unterrichten Sie Ihren behandelnden Arzt oder Ihren Apotheker.

Wenn Sie bereits andere Arzneimittel einnehmen, lesen Sie bitte auch den Abschnitt «Gleichzeitige Einnahme von SEDANXIO Hartkapseln mit anderen Arzneimitteln».

Verwendung von SEDANXIO zusammen mit Nahrungsmitteln oder Getränken

Dieses Arzneimittel kann die Wirkung von Alkohol verstärken.

Schwangerschaft

Lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Apotheker vor der Einnahme jedes Medikaments beraten.

Hinsichtlich der Einnahme von SEDANXIO während der Schwangerschaft sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um mögliche Nebenwirkungen auszuschließen. Von der Einnahme dieses Medikaments wird daher während dieses Zeitraums abgeraten.

Stillzeit

Lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Apotheker vor der Einnahme jedes Medikaments beraten.

Hinsichtlich der Einnahme von SEDANXIO während der Stillzeit sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um mögliche Nebenwirkungen auszuschließen. Von der Einnahme dieses Medikaments wird daher während dieses Zeitraums abgeraten.

Fahrzeufführung und Verwendung von Geräten

Dieses Arzneimittel kann den Tag über eine gewisse Schläfrigkeit verursachen. Wenn diese Wirkung auftritt, ist von dem Führen eines Fahrzeugs oder dem Bedienen gefährlicher Geräte unbedingt abzusehen.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von SEDANXIO

Nicht zutreffend.

Verwendung von SEDANXIO zusammen mit anderen Arzneimitteln

Unterrichten Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder in letzter Zeit eingenommen haben, auch wenn es sich dabei um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Dieses Arzneimittel kann die Wirkung von anderen Beruhigungsmitteln oder von Alkohol verstärken.

3. Wie ist SEDANXIO Hartkapseln einzunehmen?

Beachten Sie diese Anweisungen strengstens, sofern nicht anderweitig von Ihrem Arzt verordnet. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Erwachsene und Kindern über 12 Jahre:

- Nervosität: Nehmen Sie 1-3-mal täglich 1 oder 2 Kapseln ein.

- Schlafstörungen: Nehmen Sie vor dem Zubettgehen 1 oder 2 Kapseln ein.

Orale Einnahme. Schlucken Sie die Kapseln mit einem großen Glas Wasser hinunter.

Wenn Sie die Einnahme von SEDANXIO vergessen haben, setzen Sie die Behandlung fort, ohne zum Ausgleich der vergessenen Dosis eine doppelte Dosis einzunehmen.

Wirkungen, die nach Beendigung der Behandlung mit SEDANXIO auftreten können:

Erneutes Auftreten der Beschwerden.

Wenn Sie zu viel SEDANXIO eingenommen haben, als Sie sollten, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070 245 245).

Bei einer Überdosis ist eine symptomatische Behandlung erforderlich.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei der Einnahme von SEDANXIO Nebenwirkungen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage erwähnt sind und die Sie als schwerwiegend ansehen, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

5. Wie ist SEDANXIO Hartkapseln aufzubewahren?

Außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Verwenden Sie SEDANXIO nicht mehr nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums, das auf der Verpackung hinter den Buchstaben "EXP" angegeben ist. Die ersten beiden Ziffern geben

den Monat an, die letzten beiden Ziffern das Jahr. Das Produkt verfällt am letzten Tag des angegebenen Monats.

6. Ergänzende Informationen

Informationen zu diesem Medikament erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie wünschen, können Sie sich auch an den Lokalvertreter des Zulassungsinhabers wenden:

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, B-5377 Baillonville.

Abgabe: nicht verschreibungspflichtig

Letzte Aktualisierung der Packungsbeilage : 27/03/2009

Letzte Zustimmung der Packungsbeilage : 4/05/2009