

Extrait sec de *Passiflora incarnata* L. (passiflore)

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours prendre Sedistress comprimés enrobés avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 21 jours, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que Sedistress comprimés enrobés et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Sedistress comprimés enrobés
3. Comment prendre Sedistress comprimés enrobés
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Sedistress comprimés enrobés
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEDISTRESS COMPRIMÉS ENROBÉS ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Sedistress appartient à un groupe de médicaments appelés «hypnotiques et sédatifs». Il s'agit de médicaments qui ont un effet calmant et aident à mieux dormir.

Sedistress est un médicament traditionnel à base de plantes, utilisé chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans pour diminuer les symptômes modérés du stress mental, tels que la nervosité, l'inquiétude ou l'irritabilité, ainsi que pour faciliter l'endormissement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEDISTRESS COMPRIMÉS ENROBÉS

Ne prenez jamais Sedistress

- si vous êtes allergique (hypersensible) à un des composants contenus dans Sedistress.

Faites attention avec Sedistress

- En l'absence de données suffisantes, l'administration de Sedistress est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans sauf avis médical contraire.

- Dans de nombreux cas, l'administration de ce médicament répond à un besoin occasionnel ou passager et sera de courte durée. Dans certains cas, un traitement de longue durée peut s'imposer et sera évalué périodiquement par un médecin.

- En cas de persistance ou d'aggravation des symptômes, informez votre médecin traitant ou votre pharmacien.

- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « prise d'autres médicaments ».

Prise d'autres médicaments

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.

Bien qu'aucune donnée clinique ne soit disponible concernant d'éventuelles interactions lors de l'utilisation simultanée de Sedistress et de médicaments calmants (par exemple : les benzodiazépines), l'association avec ces médicaments n'est pas recommandée sauf avis contraire de votre médecin ou de votre pharmacien.

Aliments et boissons

Dans certains cas, ce médicament pourrait augmenter l'effet de l'alcool.

Grossesse et allaitement

Veillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Ne disposant pas de données suffisantes pour exclure tout effet néfaste durant la grossesse et l'allaitement, l'emploi de ce médicament est déconseillé pendant ces périodes.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament pourrait affecter l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Si cet effet se manifeste, ne pas conduire de véhicule ni manipuler de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Sedistress
Non applicable.



La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 19/05/2011

TILMAN S.A.
B-5377 Baillonville

3. COMMENT PRENDRE SEDISTRESS COMPRIMÉS ENROBÉS

Les doses habituelles pour les adultes et les adolescents de plus de 12 ans sont :

- Pour diminuer le stress mental passager : 1 à 2 comprimés matin et soir.

Sur conseil de votre médecin ou de votre pharmacien, la posologie peut être augmentée (maximum 8 comprimés par jour).

- Pour faciliter l'endormissement : 1 à 2 comprimés le soir une demi-heure avant le coucher.

Avez les comprimés avec un grand verre d'eau.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 21 jours, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de Sedistress que vous n'auriez dû

Si vous (ou quelqu'un d'autre) avez pris un nombre important de comprimés en même temps, ou si vous pensez qu'un enfant a avalé l'un des comprimés, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070 245 245).

Il n'y a pas eu de cas de surdosage décrit.

Si vous oubliez de prendre Sedistress

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Sedistress

Si vous arrêtez le traitement par Sedistress plus tôt que prévu, cela ne devrait pas provoquer l'apparition d'effets indésirables. Toutefois, les symptômes qui vous ont conduit à prendre Sedistress pourraient réapparaître.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Sedistress peut avoir des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les troubles suivants ont été rapportés : un cas de réaction allergique ayant entraîné une inflammation des vaisseaux ainsi qu'un cas de nausée et tachycardie (augmentation du rythme cardiaque). La fréquence de ces troubles n'est pas connue.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER SEDISTRESS COMPRIMÉS ENROBÉS

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Sedistress après la date de péremption mentionnée sur l'emballage extérieur après « EXP ». La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Sedistress

La substance active est l'extrait sec de parties aériennes de passiflore (*Passiflora incarnata* L.). Chaque comprimé contient 200 mg d'extrait sec natif de passiflore, ce qui correspond à 700 mg - 1000 mg de passiflore.

Les autres composants sont :

Noyau du comprimé : cellulose microcristalline, phosphate tricalcique, silice colloïdale anhydre, huile de coton hydrogénée, povidone, carboxyméthylamide sodique (type A).

Pelliculage : maltodextrine, triglycérides à chaîne moyenne, hypromellose, polydextrose, oxyde de fer rouge (E172), talc, dioxyde de titane (E171).

L'excipient utilisé dans l'extrait est la maltodextrine.

Comment se présente Sedistress et contenu de l'emballage extérieur

Sedistress se présente sous la forme de comprimés pelliculés roses, oblongs, biconvexes.

Le produit est disponible en emballages de 42 ou de 98 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'enregistrement et fabricant

Titulaire de l'enregistrement : Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgique

Fabricant : Laboratoria Wolfs n.v., Westpoort 50-58, 2070 Zwijndrecht, Belgique

Numéro de l'enregistrement : BE-TU392777

Mode de délivrance : Médicament non soumis à prescription médicale.

Dróg extract van *Passiflora incarnata* L. (passiebloem)

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 21 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter :

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt ?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?
3. Hoe gebruikt u dit middel ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel ?
6. Aanvullende informatie.

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT ?

Sedistress behoort tot een groep van geneesmiddelen die "hypnotica en sedativa" worden genoemd. Deze geneesmiddelen hebben een kalmerende werking en helpen u beter te slapen.

Sedistress is een traditioneel geneesmiddel op basis van planten. Het wordt gebruikt bij volwassenen en jongvolwassenen ouder dan 12 jaar, om de milde symptomen van mentale stress, zoals nervositeit, ongerustheid of prikkelbaarheid te verlichten en het slapen te vergemakkelijken.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN ?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?

- Gebruik van Sedistress wordt afgeraden voor kinderen jonger dan 12 jaar, behalve wanneer het wordt voorgeschreven door medisch personeel, omdat er onvoldoende informatie bestaat over een veilig gebruik in deze leeftijdsgroep.

- In veel gevallen beantwoordt de toediening van dit preparaat aan een tijdelijke of kortstondige behoefte en zal de behandeling van korte duur zijn. In sommige gevallen kan een langdurige behandeling noodzakelijk zijn. Dan zal de behandeling regelmatig worden geëvalueerd door een arts.

- Vertel het aan uw behandelende arts of uw apotheker als de symptomen aanhouden of verergeren.

- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt, lees dan ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?".

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?

Gebruikt u naast Sedistress nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan ? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Hoewel er geen klinische gegevens beschikbaar zijn over mogelijke wisselwerkingen bij gelijktijdig gebruik van Sedistress en kalmerende middelen (bv. benzodiazepinen), wordt de combinatie met deze geneesmiddelen niet aanbevolen, behalve wanneer anders geadviseerd wordt door uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken ?

In sommige gevallen kan dit geneesmiddel het effect van alcohol versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap en de borstvoeding zijn er niet voldoende gegevens beschikbaar om mogelijke schadelijke effecten uit te sluiten. Het gebruik van dit geneesmiddel in deze periode wordt dan ook afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloeden. Als dit effect zich voordoet, bestuur dan geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap.

Vervolg aan keerzijde ►

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Niet van toepassing.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL ?

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en jongvolwassenen ouder dan 12 jaar is :

- Ter verlichting van tijdelijke mentale stress : 1 tot 2 tabletten 's morgens en 's avonds.

Op advies van uw arts of apotheker kan de dosering worden verhoogd (maximaal 8 tabletten per dag).

- Helpt bij het slapen : 1 tot 2 tabletten 's avonds een half uur voor het slapengaan.

Slik de tabletten door met een groot glas water.

Als de symptomen verslechteren of voortduren na 21 dagen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen ?

Als u (of iemand in uw omgeving) een groot aantal tabletten tegelijk heeft ingenomen, of als u denkt dat een kind een van de tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts, een apotheker of het antigifcentrum (070 245 245).

Tot op heden zijn er geen gevallen van overdosering beschreven.

Bent u vergeten dit middel in te nemen ?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u eerder stopt met Sedistress dan verwacht, hoeft dit niet te leiden tot ongewenste effecten. De oorspronkelijke symptomen kunnen echter opnieuw verschijnen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Sedistress bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen werden gemeld : één geval van allergische reactie die een ontsteking van de bloedvaten heeft veroorzaakt en één geval van misselijkheid en tachycardie (versnelde hartslag). De frequentie van deze aandoeningen is niet bekend.

Krijgt u veel last van een bijwerking ? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.



Tilman®

Deze bijsluiter is goedgekeurd op : 19/05/2011

TILMAN s.a.
B-5377 Bailionville

DE

Sedistress®
Überzogene Tabletten

Trockenextrakt aus *Passiflora incarnata* L. (Passionsblume)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Sedistress überzogene Tabletten jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 21 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet :

1. Was ist Sedistress überzogene Tabletten und wofür wird es angewendet ?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Sedistress überzogene Tabletten beachten ?
3. Wie ist Sedistress überzogene Tabletten einzunehmen ?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich ?
5. Wie ist Sedistress überzogene Tabletten aufzubewahren ?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST SEDIStRESS ÜBERZOGENE TABLETTEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET ?

Sedistress gehören zu der Gruppe der Schlaf- und Beruhigungsmittel. Es handelt sich hierbei um Arzneimittel, die eine beruhigende und schlaffördernde Wirkung haben.

Sedistress ist ein traditionelles Arzneimittel auf Pflanzenbasis, das bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren zur Linderung leichter Symptome von mentalem Stress, wie zum Beispiel Nervosität, Angstzuständen oder Reizbarkeit, und als Einschlafhilfe eingesetzt wird.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON SEDIStRESS ÜBERZOGENE TABLETTEN BEACHTEN ?

Sedistress darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Passionsblume oder einer der sonstigen Bestandteile von Sedistress sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Sedistress ist erforderlich,

- Mangels Unzureichender Daten wird von einer Anwendung von Sedistress bei Kindern unter 12 Jahren abgeraten, außer wenn der Arzt sie ausdrücklich verschrieben hat.

- In zahlreichen Fällen wird dieses Arzneimittel sporadische oder vorübergehende Behandlungen eingesetzt und dient hauptsächlich zur Kurzzeittherapie. In manchen Fällen, kann eine langfristige Behandlung erforderlich sein, die regelmäßig vom Arzt überwacht werden muss.

- Sollten die Symptome anhalten oder sich verschlimmern, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

- Falls Sie bereits andere Medikamente einnehmen, lesen Sie bitte ebenfalls den Abschnitt "Einnahme anderer Arzneimittel".

Bei Einnahme von Sedistress mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Auch wenn keine klinischen Ergebnisse bezüglich möglicher Wechselwirkungen bei gleichzeitiger Anwendung von Sedistress und anderen Beruhigungsmitteln (zum Beispiel: Benzodiazepine) bekannt sind, wird von einer gleichzeitigen Einnahme abgeraten, falls nicht anders von Ihrem Arzt oder Apotheker verordnet.

Bei Einnahme von Sedistress zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

In manchen Fällen kann dieses Arzneimittel die Wirkung von Alkohol verstärken.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Mangels ausreichender Erfahrungen können schädliche Auswirkungen während der Schwangerschaft und der Stillzeit nicht ausgeschlossen werden und es wird daher von der Einnahme dieses Arzneimittels in diesen Fällen abgeraten.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Dieses Medikament kann die Fähigkeit, Maschinen zu fahren oder zu bedienen beeinträchtigen. Sollte diese Wirkung eintreten, fahren oder bedienen Sie keine Maschine.



Tilman®

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im : 19/05/2011

TILMAN s.a.
B-5377 Bailionville

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL ?

Vor der geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel ?

De werkzame stof in dit middel is droog extract van bovengrondse delen van de passiebloem (*Passiflora incarnata* L.). Elke tablet bevat 200 mg droog extract van passiebloem, wat overeenkomt met 700 mg - 1000 mg passiebloem.

De andere bestanddelen zijn :

Kern van de tablet : microkristallijne cellulose, tricalciumfosfaat, watervrij colloïdale siliciumdioxide, gehydrogeneerde katoenzaadolie, povidon, carboxymethylamidonnatrium (type A).

Coating : maltodextrine, middellange-keten triglyceriden, hypromellose, polydextrose, rood ijzeroxide (E172), talk, titaniumdioxide (E 171).

Hulpstof in het extract is maltodextrine.

Hoe ziet dit middel eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?

Sedistress wordt geleverd als een roze, langwerpige, aan beide kanten bolronde, filmomhulde tablet. Het middel is verkrijgbaar in verpakkingen van 42 of 98 tabletten.

Mogelijk zijn niet alle verpakkingsoorten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen : Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Bailionville, België

Fabrikant : Laboratoria Wolfs n.v., Westpoort 50-58, 2070 Zwijndrecht, België

Registratienummer : BE-TU392777

Afleveringswijze : Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Sedistress

Entfällt.

3. WIE IST SEDIStRESS ÜBERZOGENE TABLETTEN EINZUNEHMEN ?

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren :

- Zur Behandlung bei vorübergehendem mentalen Stress : 1 bis 2 Tabletten morgens und abends.

Auf Rat Ihres Arzt oder Apothekers kann die Dosierung erhöht werden (höchstens 8 Tabletten pro Tag).

- Fördert den Schlaf : 1 bis 2 Tabletten am Abend, eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen.

Nehmen Sie die Tabletten mit einem großen Glas Wasser ein.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 21 Tagen keine Besserung eintritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge von Sedistress eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie (oder jemand anderes) eine große Anzahl Tabletten gleichzeitig eingenommen haben, oder falls Sie annehmen, dass ein Kind eine der Tabletten verschluckt hat, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt, Apotheker oder rufen Sie den Giftnotruf (070 245 245) an.

Überdosierung : bisher nicht bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Sedistress vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme von Sedistress vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Sedistress abbrechen

Wenn Sie die Behandlung mit Sedistress früher als vorgeschrieben beenden, dürfte es nicht zu Nebenwirkungen kommen. Allerdings könnten die Symptome, aufgrund derer Sie ursprünglich Sedistress eingenommen haben, wieder auftreten.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH ?

Wie alle Arzneimittel können Sedistress Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Über folgende Nebenwirkungen wurde berichtet: ein Fall einer allergischen Reaktion, die eine Entzündung der Blutgefäße verursachte, sowie ein Fall mit Übelkeit und Herzrasen (Erhöhung des Herzrhythmus). Die Häufigkeit des Auftretens dieser Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST SEDIStRESS ÜBERZOGENE TABLETTEN AUFZUBEWAHREN ?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Aufbewahrungsbedingungen zu beachten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen Sedistress nach dem auf der Verpackung mit "EXP" bezeichneten Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsmüll entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Sedistress enthält

Der Wirkstoff ist Trockenextrakt der oberirdischen Teile der Passionsblume (*Passiflora incarnata* L.). Jede Tablette enthält 200 mg Trockenextrakt der Passionsblume, was 700 mg - 1000 mg Passionsblume entspricht.

Die sonstigen Bestandteile sind :

- Tablettenkern : Mikrokristalline Cellulose, Tricalciumphosphat, kolloidales Siliciumdioxid, gehärtetes Baumwollsaatöl, Povidon, Natriumcarboxymethylstärke (Typ A)
- Tablettenüberzug : Maltodextrin, mittelkettige Triglyceride, Hypromellose, Polydextrose, rotes Eisenoxid (E172), Talk, Titandioxid (E171).
- Beim Hilfsstoff des Extrakts handelt es sich um Maltodextrin.

Wie Sedistress aussieht und Inhalt der Packung

Sedistress sind längliche, bikonvexe, rosa überzogene Tabletten.

Das Produkt ist in Packungen von 42 oder 98 Tabletten erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen vermarktet.

Pharmaceutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber : Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Bailionville, Belgien

Hersteller : Laboratoria Wolfs n.v., Westpoort 50-58, 2070 Zwijndrecht, Belgien

Zulassungsnummer : BE-TU392777

Wie ist Sedistress erhältlich

Dieses Medikament ist ohne ärztliche Verschreibung erhältlich.